

CREMA

TRATAMIENTO DE HEMATOMAS SUPERFICIALES PRODUCIDOS POR GOLPES, CONTUSIONES Y TRAUMAS

COMPOSICION

Cada g contiene:

Pentosano polisulfato sódico 5 mg

Excipientes:

Alcanfor 5 mg

Otros, c.s.

PROPIEDADES

El pentosano polisulfato sódico pertenece al grupo farmacoterapéutico de los antivaricosos tópicos, que aplicado sobre la piel mejora el flujo sanguíneo favoreciendo la disolución de los coágulos.

El alcanfor proporciona una ligera acción anestésica tópica sobre las terminaciones de los nervios cutáneos.

Este doble mecanismo de acción se traduce positivamente en beneficio del paciente, ya que aumenta el alivio y acorta el período de recuperación, esto en comparación cuando ambas sustancias se utilizan de forma separada.

INFORMACION CLINICA

INDICACIONES

Alivio local sintomático de:

Hematomas superficiales producidos por golpes, contusiones y traumas.

Pesadez y tirantez en piernas con várices.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida al fármaco o a cualquiera de los componentes de este medicamento. Pacientes con manifestaciones hemorrágicas o alteraciones importantes de la hemostasia.

EFFECTOS INDESEABLES

Únicamente se han descrito reacciones alérgicas ocasionales.

En caso de observarse la aparición de reacciones adversas debe suspenderse el tratamiento.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Para uso externo solamente, evítase el contacto con los ojos y nunca aplicar sobre mucosas, ni con heridas abiertas o infectadas.

En caso de problemas venosos de origen trombótico (como por ejemplo tromboembolismo) se recomienda aplicar el producto suavemente y sin masaje.

No utilizar de forma prolongada ni en zonas muy extensas de la piel. Valorar la situación clínica si el paciente sufre de alguna otra dolencia, es alérgico o está utilizando algún otro medicamento. Si los síntomas persisten más de 5 días o se produce irritación o empeoramiento, deberá evaluarse la situación clínica del paciente.

USO EN EMBARAZO, LACTANCIA Y EN NIÑOS

Puesto que no existe una experiencia clínica adecuada sobre la

seguridad de esta sustancia por vía cutánea durante el embarazo y la lactancia, se recomienda no utilizarlo en estas situaciones salvo mejor criterio médico.

Dado que no se han realizado estudios sobre seguridad y eficacia en niños menores de 1 año, no se recomienda su uso en éstos.

INTERACCIONES

Aunque no se ha descrito hasta el momento ninguna interacción medicamentosa con el uso cutáneo de este medicamento, el médico debe valorar su utilización conjunta con otros fármacos aplicados por esta vía.

SOBREDOSIS

En el caso de ingestión accidental del contenido del tubo, se recomienda beber una buena cantidad de agua u otro líquido acuoso y si aparecieran trastornos digestivos, acudir a un centro médico y aplicar tratamiento sintomático.

MODO DE EMPLEO

Adultos y niños mayores de un año:

Aplicar en la zona afectada con un masaje suave, una fina capa de crema 3 ó 4 veces al día.

VIA DE APLICACION

Tópica.

Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre consultar a su médico.

En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.

INFORMACION FARMACEUTICA

DURACION DE ESTABILIDAD

Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION

Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C.

PRESENTACION

Caja conteniendo un tubo de 60 g.

Registro Sanitario No. RM2024-2238

Venta por receta médica.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Producto fabricado para Euro Ltd., S.R.L.

por Ethical Pharmaceutical, S.R.L.

de República Dominicana

Registro Industrial 14109.