

Diclofenac
Vitamina B₁
Vitamina B₆
Vitamina B₁₂

COMPRIMIDOS

ANTINEURITICO - ANALGESICO - ANTIINFLAMATORIO

COMPOSICION

Cada comprimido contiene:

Diclofenac potásico	50 mg
Vitamina B ₁	50 mg
Vitamina B ₆	50 mg
Vitamina B ₁₂ (mecobalamina)	1000 mcg
Excipientes, c.s.	

PROPIEDADES

Combina equilibradamente el poder analgésico y antiinflamatorio del diclofenac potásico con la acción de las vitaminas antineuríticas del complejo B.

Esta acción múltiple (analgésica-antiinflamatoria-antineurítica), es altamente efectiva en todo tipo de inflamación de patologías musculoesqueléticas dolorosas.

El diclofenac potásico es un analgésico antiinflamatorio de acción rápida y potente. Como analgésico no esteroide produce esos efectos al inhibir la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas, las cuales desempeñan un importante papel como mediadoras de la inflamación, el dolor y la fiebre. Se ha demostrado que es un potente inhibidor de la ciclooxigenasa, una enzima del complejo prostaglandina sintetasa, por lo que se requieren concentraciones mínimas para obtener una acción analgésica y antiinflamatoria eficaz.

Las vitaminas B₁, B₆ y B₁₂ participan en el metabolismo de todas las células del organismo, pero su actividad predominante se ejerce sobre las células del sistema nervioso, por lo que se les ha denominado vitaminas neurotropas.

TOXICOLOGIA

No existe evidencia de efectos carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos y sobre la fertilidad en humanos y en animales de experimentación.

INFORMACION CLINICA

INDICACIONES

Antiinflamatorio con acción analgésica y antineurítica. Lumbalgias, cervicalgias, radiculitis, neuropatías periféricas de diversa etiopatogenia: Neuralgias faciales, del trigémino, intercostal, herpética, neuropatía alcohólica, diabética, síndrome del túnel del carpo. Procesos reumáticos dolorosos, tanto inflamatorios como degenerativos activados por inflamación, por ejemplo: Artrosis, espondiloartrosis, espondilitis anquilosante (enfermedad de Bechterew), ataque agudo de gota. Reumatismo de los tejidos blandos y afecciones inflamatorias dolorosas no reumáticas.

ODONTOLOGIA

Prevención y tratamiento de cuadros dolorosos o inflamatorios por: Cirugías, fracturas dental o maxilar, exodoncias, pulpitis, lesiones de partes blandas.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de sus principios activos. Trastornos hematopoyéticos no aclarados. Úlcera gástrica y duodenal. Niños menores de 12 años y en pacientes cuyos ataques de asma bronquial, rinitis o urticaria son causados por el ácido acetilsalicílico o sus derivados.

EFECTOS INDESEABLES

Ocasionalmente se han observado: Vómitos, diarrea, cefaleas, irritabilidad, insomnio, cansancio, mareos, erupción cutánea y prurito.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Si hay úlcera péptica o hemorragia gastrointestinal debe suspenderse la administración de este producto.

Tener precaución en pacientes con historial sensible a la vitamina B1.

USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA

Su uso durante el embarazo y la lactancia queda a criterio médico.

INTERACCIONES

Debe evitarse el uso simultáneo con otros medicamentos como: Digoxina, litio, diuréticos, antihipertensivos, glucocorticoides, metotrexato, ácido acetilsalicílico y L-dopa.

SOBREDOSIS

Las medidas terapéuticas en el caso de sobredosis son las siguientes: Lavado gástrico y tratamiento con carbón activado, lo más rápido posible para evitar la

absorción. El tratamiento sintomático y de soporte se administrará en caso de complicaciones como hipotonía, insuficiencia renal y depresión respiratoria.

USO Y DOSIS

Salvo criterio contrario del médico, un comprimido 2-3 veces al día.

VIA DE ADMINISTRACION

Oral.

Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre consultar a su médico.

En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.

INFORMACION FARMACEUTICA

DURACION DE ESTABILIDAD

Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION

Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C, proteger de la luz.

PRESENTACION

Caja conteniendo 25 tirillas de 4 comprimidos para detallar.

NOTA IMPORTANTE

Este producto se encuentra envasado y protegido en una adecuada y rigurosa laminación, especialmente diseñada para evitar su exposición con la luz y humedad, descartando además que por descuidos involuntarios los niños puedan acceder al mismo.

Registro Sanitario No. RM2023-2084

Venta por receta médica.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Producto fabricado por

Ethical Pharmaceutical, S.R.L.

de República Dominicana

Registro Industrial 14109